



TITLE:

BCGモ亦タ「イムペヂン」ヲ產生
スルヤ

AUTHOR(S):

平尾, 猛

CITATION:

平尾, 猛. BCGモ亦タ「イムペヂン」ヲ產生スルヤ. 日本外科宝函 1933,
10(4): 818-827

ISSUE DATE:

1933-07-20

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/203357>

RIGHT:

BCGモ亦タ「イムペヂン」ヲ產生スルヤ

京都帝國大學醫學部外科學研究室(鳥瀉教授指導)

大學院學生 醫學士 平 尾 猛

Produziert der BCG-Stamm auch das Impedin?

Von

Dr. T. Hirao.

[Aus dem Laboratorium der Kaiserl. Chirurg. Universitätsklinik **Kyoto**

(Direktor: Prof. Dr. **R.Torikata**).]

Dass pathogene Mikroben Impedine produzieren, ist seit 1917 mehrfach bewiesen worden. Da der BCG-Stamm apathogen umgeändert zu sein scheint, so ist angezeigt, zu prüfen, ob dieser Stamm das Impedin produziert oder nicht.

Testmaterialien.

BCGNF. Der BCG-Stamm wurde 1930 unserem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. *R. Torikata*, vom Prof. Dr. *E. Silberschmidt* in Zürich zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschungen geliefert worden. An dieser Stelle sprechen wir Herrn Prof. *Silberschmidt* und Herrn Prof. *Calmette* unseren verbindlichsten Dank aus.

Eine 1 Monat alte Bouillonkultur von BCG wurde durch Filterkerze getrieben. Das Filtrat wird zur längeren Aufbewahrung in 0.5 proz. Carbolsäure versetzt und durch die Abkürzung von BCGNF bezeichnet.

BCGFK. Das native Filtrat wird in einem bei 100°C siedenden Wasserbade eine halbe Stunde lang abgekocht und wird mit der Abkürzung von BCGFK bezeichnet.

Die beiden Testmaterialien BCGNF und BCGFK sehen wasserklar aus und unterscheiden sich äusserlich in nichts.

Versuchsanordnung.

Wir haben nach der originalen Angabe von *H. Sugura* die die in der die Blutbahn vor sich gehende normale Phagozytose der Staphylokokken beeinflussende Eigenschaft von BCGNF und BCGFK ceteris paribus verglichen.

Versuchsergebnisse.

Die Ergebnisse der Versuche sind in folgender Tabelle zusammengestellt.

Die die normale Phagozytose in der Blutbahn der Meerschweinchen
beeinflussende Fähigkeit von BCGNF und BCGFK.

Art des Testmaterials	Menge ccm	Grad der Hyperleukozytose	Phagozytat	Koeffizient der Phagozytose
BCGNF	0,1	105	35,6	100
BCGFK	0,1	94	47,4	133
Bouillon	0,1	86	15,8	47
BCGNF	0,2	119	41,0	100
BCGFK	0,2	77	67,3	164
Bouillon	0,2	105	35,1	86
BCGNF	0,4	86	22,6	100
BCGFK	0,4	111	40,4	179
Bouillon	0,4	115	20,4	90

Zusammenfassung.

1. Auch der BCG-Stamm produziert das Impedin.
2. Apathogenität bedeutet nicht die Impedinlosigkeit.
3. Ausgedrückt durch Prozentwerte der Phagozytosenkoeffizienten ist die maximale Antigenavidität bei BCGFK um 64 Proz. grösser als die bei BCGNF.
4. Auch der BCG-Stamm unterliegt der Impedintheorie und somit müssen die aus BCG hergestellten Kocktogene bessere immunisatorische Erfolge ergeben als die korrespondierenden nativen BCG-Kulturen. (Autoreferat)

緒 言

人型結核菌が Δ イムベデン Γ ヲ產生スルコトハ、其ノ純培養ニ就テモ、又ハ其ノ感染組織乃至寒性膿ニ就テモ立證セラレタリ(廣瀬, 林茂), 然ルニカルメツト, ゲラン兩人ハ牛型結核菌ヲ5% Δ グリセリン Γ 加牛膽汁馬鈴薯培養基上ニ230代培養セルニ、病原性ヲ喪失セルモ、免疫性アリト稱シ、ソレヲ Δ BCG Γ ト命名セリ。故ニ余等ハ病原性ヲ喪失シタリト稱セラルル此 BCG 菌ニ就テ Δ イムベデン Γ ノ有無ヲ檢シ、以テ病原性ト Δ イムベデン Γ トノ關係ヲ知ラント欲ス。蓋シ Δ イムベデン Γ 學說ニ從ヘバ病原性ノ大ナル菌ホド Δ イムベデン Γ 勢力大ニシテ、反對ニ病原性小ナル菌ホド Δ イムベデン Γ 勢力小ナルベキ理ナレバナリ。

實 驗 材 料

生濾液, 煮濾液 5% Δ グリセリン Γ 加肉汁ニ BCG ヲ1ヶ月培養シ、陶土壁ニテ濾過シ、無菌濾液ヲ得之ニ0.5%ノ割合ニ石炭酸ヲ加ヘ、一部ハ其儘生濾液トシ、他ハ100度ニ沸騰シツ、アル重湯煎中ニテ30分加熱シ之ヲ煮濾液トシ供試セリ。

對照肉汁 培養ニ用キタル5% Δ グリセリン Γ 肉汁ニ0.5%ノ割合ニ石炭酸ヲ加ヘシモノナリ。

BCG 菌 チューリヒ大學衛生學教授ジルベルシュミット氏ヲ經テ、鳥瀉教授ガカルメツト氏ヨリ分與セラレタルモノニシテ、1930年當時チューリヒ市ニ在リシ、滿洲醫科大學教授

平山博士ヨリ當教室へ送り届ケラレタルモノナリ。

菌液 黄色葡萄狀球菌ノ 24時間寒天斜面培養ヲ 0.5%石炭酸加0.85%食鹽水ニ浮游セシメ、攝氏60度重湯煎中ニテ30分加熱殺菌シ、之ヲ3度強力遠心シ新鮮ナル食鹽水ニテ洗ヒテ後菌液ヲ作りタルモノニシテ其ノ1.0兊中ニハ約3度目即チ0.0021兊ノ菌量ヲ含有ス。

實 驗 方 法

海狗後肢皮下靜脈ヨリ採血シ、注射前ノ血液1立方兊内ノ白血球數ヲ檢シ同時ニ血液塗抹標本ヲ製シ置ク。

抗原ヲ腹腔へ注射シタル後30分ニシテ海狗頸靜脈内ヨリ菌液1.0兊ヲ注入シ、其後30分、1時間、2時間、4時間、8時間ニ亘リ前記後下肢皮下靜脈ヨリ採血シ、單位容積内ノ白血球數ヲ計算シ、他方血液塗抹標本ヲ製シ置キ、メチールアルコールヲ固定後ギームザ氏液染色、鏡檢、白血球200個中ニ於ケル中性多型核白血球ノ喰細胞「喰」,被喰菌數「菌」,喰菌子「子」ヲ計上セリ。

實驗第1 生濾液、煮濾液及ビ肉汁0.1兊注射後ノ喰菌作用

實 驗 結 果

所見ハ第1表乃至第3表及ビ第1圖乃至第3圖ニ示サレタリ。

第 1 表 BCG生濾液0.1兊注射後ノ喰菌作用(3頭平均)

		血液單位容積内白血球數	白血球増減率	白血球 200 個 中				
				淋巴球	中 性 多 型 核			
				%	%	喰	菌	子
注 射 前		7250	100	74.5	25.5	0	0	0
注 射 後	30 分	8150	112	65.5	34.5	7.0	29.0	36.0
	1 時 間	8450	117	57.5	42.5	8.0	26.7	34.7
	2 時 間	7780	107	38.5	61.5	11.0	43.3	54.3
	4 時 間	7000	97	26.0	74.0	6.3	21.3	27.6
	8 時 間	6300	91	47.5	52.5	6.7	18.7	25.4
平 均		7596	105	47.0	53.0	7.8	27.8	35.6


第 2 表 BC 30分煮濾液0.1兊注射後ノ喰菌作用(3頭平均)

		血液單位容積内白血球數	白血球増減率	白血球 200 個 中				
				淋巴球	中 性 多 型 核			
				%	%	喰	菌	子
注 射 前		7080	100	62.0	38.0	0	0	0

注 射 後	30 分	5370	76	57.5	42.5	17.7	46.7	64.4
	1 時間	3970	56	53.5	46.5	17.3	55.3	72.6
	2 時間	8170	115	36.5	63.5	12.3	25.0	37.3
	4 時間	8300	117	23.5	76.5	10.7	25.7	36.4
	8 時間	7350	104	36.5	63.5	7.1	19.3	26.4
平 均		6630	94	41.5	58.5	13.0	34.4	47.4

第 3 表 肉汁0.1㏍注射後ノ喰菌作用(3頭平均)

		血液單位容積內白血球絕對數	白血球增減率	白血球 200 個 中				
				淋巴球	中 性 多 型 核			
					%	%	喰	菌
注 射 前		13580	100	47.5	52.5	0	0	0
注 射 後	30 分	7770	58	50.0	50.0	9.0	16.3	25.3
	1 時 間	10030	74	49.5	50.5	3.0	5.0	8.0
	2 時 間	13940	103	21.5	78.5	8.0	17.0	25.0
	4 時 間	12650	93	24.5	75.5	5.7	9.3	15.0
	8 時 間	13530	100	28.0	72.0	2.3	3.3	5.6
平 均		11584	86	34.7	63.3	5.6	10.2	15.8




2時間目、煮濾液ハ30分、肉汁ハ30分最多ナリ。前後5回ノ平均數生濾液7.8、煮濾液13.0、肉汁5.6ニシテ煮濾液ハ生濾液ヨリモ遙ニ優勢ナリ。

(3) 被喰菌數_レ菌¹ハ生濾液ハ

所 見 概 括

(1) 中性多型核白血球數ハ生濾液、煮濾液トモニ4時間目ニ肉汁ハ2時間目ニ最多數ニシテ、平均煮濾液ハ生濾液ヨリ少シ數多ク、肉汁ハ最多數ナリ。

(2) 喰細胞數_レ喰¹ハ生濾液ハ




2時間目, 煮濾液1時間目,
肉汁ハ2時間目最多ニシテ
時ヲ經ルニ從ヒ減ズ。

平均數ヲ觀ルニ生濾液7.8
煮濾液34.4, 肉汁10.2。

(4) 喰菌子數_L子_↑ハ生濾
液ハ2時間, 煮濾液1時間
目, 肉汁30分最多ニシテ,
平均生濾液35.6, 煮濾液47.4
肉汁15.8。

(5) 白血球増減率平均數
ハ生濾液105, 煮濾液94, 肉
汁86ナリ。



實驗第 2 生濾液, 煮濾液及ビ肉汁0.2㄄注射後ノ喰菌作用。

實 驗 結 果

所見ハ第4表乃至第6表及ビ第4圖乃至第6圖ニ示サレタリ。

第 4 表 BCG生濾液0.2㄄注射後ノ喰菌作用(3頭平均)

		血液單位容積內白血球絕對數	白血球增減率	白血球 200 個 中				
				淋巴球	中 性 多 型 核			
				%	%	喰	菌	子
注 射 前		7120	100	62.5	37.5	0	0	0
注 射 後	30 分	8550	120	56.0	44.0	16.0	24.5	40.5
	1 時間	7220	101	35.5	64.5	12.7	34.3	47.0
	2 時間	7850	110	34.5	65.5	13.7	42.0	55.7
	4 時間	8920	125	27.0	73.0	6.7	23.0	29.7
平 均		8478	119	37.1	62.9	11.4	29.6	41.0

第 5 表 BCG30分煮濾液0.2㄄注射後ノ喰菌作用(3頭平均)

		血液單位容積內白血球絕對數	白血球增減率	白血球 200 個 中				
				淋巴球	中 性 多 型 核			
				%	%	喰	菌	子
注 射 前		6980	100	78.5	21.5	0	0	0

注 射 後	30 分	4580	66	71.0	29.0	9.3	41.7	51.0
	1 時間	5280	76	51.0	49.0	16.7	58.0	74.7
	2 時間	6470	93	29.5	70.5	19.0	83.7	102.7
	4 時間	5580	80	30.0	70.0	15.7	48.7	64.4
	8 時間	5650	81	53.5	46.5	9.7	34.0	43.7
平 均		5512	77	31.0	69.0	14.1	53.2	67.3


第 6 表 肉汁0.2ㄲ注射後ノ喰菌作用(3頭平均)

		血液單位容積內白血球數	白血球增減率	白 血 球 200 個 中				
				淋巴球	中 性 多 型 核			
					%	%	喰	菌
注 射 前		6950	100	67.0	33.0	0	0	0
注 射 後	30 分	7520	108	63.5	36.5	6.7	20.0	26.7
	1 時 間	7720	111	42.5	57.5	14.7	40.3	55.0
	2 時 間	8070	115	34.0	66.0	9.3	30.0	39.3
	4 時 間	6480	93	32.5	67.5	7.3	18.7	26.0
	8 時 間	6750	97	52.0	48.0	8.3	20.0	28.3
平 均		7308	105	44.9	55.1	9.3	25.8	35.1

所 見 概 括


(1) 中性多型核白血球數, 生濾液ハ4時間目, 煮濾液2時間目肉汁4時間目ニ最多ニシテ, 平均數ハ生煮相近似シ, 肉汁ハ少數

第 4 圖 BCG生濾液, 30分煮濾液及肉汁 0.2ㄲニヨリ促進サレタル喰細胞數ノ關係



I = 生濾液 II = 30分煮濾液
III = 肉汁


第 5 圖 BCG生濾液, 30分煮濾液及肉汁 0.2ㄲニヨリ促進サレタル被喰菌數ノ關係



I = 生濾液 II = 30分煮濾液
III = 肉汁

ナリ。

(2) 喰細胞數ノ喰 生濾液ハ30分目, 煮濾液2時間目, 肉汁ハ1時間目ニ最多數ニシテ, 其平均



數生濾液11.4, 煮濾液14.1, 肉汁9.3ナリ。

(3) 被喰菌數_{菌⁺} 生濾液煮濾液トモニ2時間目, 肉汁ハ1時間目ニ最多數ニテ 其平均數生濾液ハ29.6, 煮濾液53.2, 肉汁25.8。

(4) 喰菌子數_{子⁺} 生濾液煮濾液トモニ2時間目, 肉汁ハ1時間目最多數ナリ。其平均數生濾液41.0, 煮濾液67.3, 肉汁35.1ニシテ煮濾液ノ効果顯著ナリ。

(5) 白血球増減率平均 生濾液119, 煮濾液77, 肉汁105。

實驗第3 生濾液, 煮濾液及ビ肉汁0.4㏍注射後ノ喰菌作用

實驗結果

所見ハ第7表乃至第9表及ビ第7圖乃至第9圖ニ示サレタリ。

第7表 BCG生濾液0.4㏍注射後ノ喰菌作用(3頭平均)

		血液單位容積內白血球絕對數	白血球增減率	白血球 200 個 中				
				淋巴球	中 性 多 型 核			
					%	%	喰	菌
注 射 前		7450	100	62.5	37.5	0	0	0
注 射 後	30 分	7480	100	66.5	33.5	6.7	13.3	20.0
	1 時 間	5380	72	57.0	43.0	9.0	20.3	29.3
	2 時 間	7680	103	50.5	49.5	6.7	25.0	31.7
	4 時 間	7220	97	32.0	68.0	4.0	8.0	12.0
	8 時 間	4230	57	36.5	63.5	6.3	14.0	20.3
平 均		6358	86	48.5	51.5	6.5	16.1	22.6


第8表 BCG30分煮濾液0.4㏍注射後ノ喰菌作用(3頭平均)

		單內球數 液積血對 血位白絕	白血球 增減率	白 血 球 200 個 中				
				淋巴球	中 性 多 型 核			
					%	%	喰	菌
注	射 前	9380	100	60.0	40.0	0	0	0

注 射 後	30 分	3850	89	56.5	43.5	14.7	53.0	67.7
	1 時間	11230	120	43.5	56.5	12.0	40.0	52.0
	2 時間	11520	123	34.5	65.5	9.3	26.0	35.3
	4 時間	10580	113	29.0	71.0	8.3	22.0	30.3
	8 時間	8030	86	47.5	52.5	4.3	12.7	17.0
平 均		9542	111	42.2	57.8	9.7	30.7	40.4

第 9 表 肉汁0.4坵注射後ノ喰菌作用(3頭平均)

		血液單位容積內白血球絕對數	白血球增減率	白血球 200 個 中				
				淋巴球	中 性 多 型 核			
					%	%	喰	菌
注 射 前		9370	100	60.5	39.5	0	0	0
注 射 後	30 分	6050	65	76.0	24.0	6.3	12.3	18.6
	1 時 間	17180	183	64.0	36.0	6.0	11.7	17.7
	2 時 間	12820	137	38.0	62.0	6.0	19.0	25.0
	4 時 間	7480	80	42.5	57.5	6.3	13.0	19.3
	8 時 間	11150	119	35.5	64.5	4.7	16.7	21.4
平 均		10936	115	51.2	48.8	5.9	14.5	20.4





(2) 喰細胞數_L喰⁷ 生濾液, 肉汁ハ1時間目, 煮濾液30分目最多數ニシテ其平均數ハ 生濾液6.5, 煮濾液9.7, 肉汁5.9。

(3) 被喰菌數_L菌⁷ 生濾液肉汁トモニ 2時目, 煮濾液30分目最多ニテ, 平均數生濾液 16.1煮

所 見 概 括

(1) 中性多型核白血球數ハ 生濾液, 煮濾液トモ第4時間目, 肉汁ハ 8時間目最多ニシテ, 其平均數煮濾液ハ生濾液ヨリ少シク多ク, 肉汁最少數ナリ。






I = 生濾液 II = 30分煮濾液 III = 肉汁

所見總括並ビニ考察

全實驗成績ヲ綜合シ第10表及ビ第10圖ヲ得。仍テ次ノ諸項ヲ認識シ得ベシ。

第10表 BCG生濾液, 30分煮濾液並ビニ肉汁ノ喰菌作用促進ノ上ニ現レタル抗原性能劬力ノ總括的所見

抗原種類	注射量 g	白血球平均數	白血球率	喰菌子數	喰菌比率	中性多核白血球%	原表
生濾液	0.1	7596	105	35.6	100	53.0	I
煮濾液	0.1	6630	94	47.4	133	58.5	II
肉汁	0.1	11584	86	15.8	47	65.3	III
生濾液	0.2	8478	119	41.0	100	62.9	IV
煮濾液	0.2	5512	77	67.3	164	69.0	V
肉汁	0.2	7308	105	35.1	86	55.1	VI
生濾液	0.4	6358	86	22.6	100	51.5	VII
煮濾液	0.4	9942	111	40.4	179	57.8	VIII
肉汁	0.4	10936	115	20.4	90	48.8	IX



濾液30.7, 肉汁14.5。

(4) 喰菌子數 L_{100} ハ生濾液並ビニ肉汁2時目, 煮濾液30分目最多ク, 平均數生濾液 22.6 煮濾液40.4, 肉汁20.4ニシテ, 効力ニ於テ煮濾液ハ生濾液ヨリモ非常ニ優秀, 生濾液ハ對照肉汁ヨリモ少シク勝レタリ。

(5) 白血球増減率平均數, 生濾液86, 煮濾液111, 肉汁115ナリ。

(1) 中性多型核白血球數ハ生濾液, 煮濾液トモ相近似セルニ關セズ, 各抗原量ヲ通ジ煮濾液ハ生濾液ニ比シ喰菌作用遙ニ優勢ナリ。

(2) 抗原量ヲ 0.1 g ヨリ 0.2 g ニ增量スルニ從ヒ, 喰菌作用モ生煮トモ上行位相ヲ辿リ, 0.4ニ增量セルニ下行位相ヲトリタリ。

(3) 白血球増減率ニ於テ生濾液, 煮濾液トモ大差無シ, 即チ毒力ニ於テ大差無シ。

(4) 喰菌子ノ比率ヲ檢スルニ

抗原量0.1 r ノ場合

生 : 煮 = 35.6 : 47.4 = 100 : 133

抗原量0.2 r ノ場合

生 : 煮 = 41.0 : 67.3 = 100 : 164

抗原量0.4 r ノ場合

生 : 煮 = 22.6 : 40.4 = 100 : 179

喰菌作用ニ於テ煮濾液ハ生濾液ニ比シ用量0.1 r ニテハ33%, 0.2 r ニテハ64%, 0.4 r ニテハ79%ノ優勢ヲ示セルハ, 生濾液ハ喰菌作用阻止物質即チ L イムペヂン r ヲ含ミ其使用量ノ増加ニ伴イテ L イムペヂン r 現象モ亦タ大トナリシモノト考ヘザルベカラズ。

結 論

(1) BCG 菌ノ 1ヶ月肉汁培養液ヲ陶土壁ニテ濾過シ之ヲ生濾液トシ, コノ一部ヲ攝氏100度ニ加熱スルコト30分ニシテ煮濾液ヲ得, 此等生又ハ煮ノ抗原ヲ海狸ニ注射シ流血中黃色葡萄狀球菌喰菌現象ヲ指標トシ檢セル, 抗原能働力ニ於テ生濾液ハ煮濾液ヨリモ遙ニ劣リタリ。

(2) 抗原量0.2 r ニテ喰菌作用生煮トモ最高ニシテ, 喰菌子比率ニ於テ煮濾液ハ生濾液ヨリモ64%優勢ナリ。

(3) 病原性ナシト稱セラルル BCG 菌モ亦タ L イムペヂン r ヲ含有スルモノニシテ病原性ノ喪失ハ L イムペヂン r 產生喪失ヲ意味セザルモノナリ。

(4) BCG モ亦タ L イムペヂン r 學說ノ支配下ニ屬スルモノニシテ其ノ免疫上ノ實行ニ向ツテモ亦タ L イムペヂン r 學說ニ從フベキモノナリ。